

ПРЕГИНОР®

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ!

Dr.Reddy's 

Контроль над токсикозом на ранних сроках беременности

 1-2 капсулы в день во время еды в течение 1-2 недель*

Гингеролы экстракта имбиря
оказывают влияние:

- на серотониновые рецепторы через центральный механизм
- на периферическом уровне, улучшая тонус и моторику желудка

Магний участвует:

- в энергетических процессах
- в передаче нервного импульса

Витамин В6 способствует:

- улучшению усвоения магния и его метаболизма в клетке, обеспечению функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем



*Лист-вкладыш Preginor СРР КЗ.16.01.98.003.R.000023.04.21 от 23.04.2021

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ



Раннее начало терапии помогает предотвратить развитие более сильных проявлений и **улучшить качество жизни беременных женщин!**

Модифицированная шкала количественной оценки рвоты и тошноты беременных (PUQE)

Как долго в среднем за день вы испытываете тошноту?	Совсем нет	1 час или менее	2–3 часа	4–6 часов	Более 6 часов
В среднем, сколько раз в день у вас случается рвота?	Нет рвоты	1–2 раза	3–4 раза	5–6 раз	7 или более раз
В среднем, сколько раз в день вы испытываете позывы на рвоту или рвотные спазмы без рвоты?	Нет	1–2 раза	3–4 раза	5–6 раз	7 или более раз
Баллы	1	2	3	4	5

Общий балл: 6 или менее – легкая степень; 7-12 – средняя; 13 или более – тяжелая

3-12 баллов по шкале PUQE и отсутствие осложнений:

- Изменение образа жизни
- Диета
- **Немедикаментозные ЛС**

Более 13 баллов по шкале PUQE и отсутствие осложнений:

- Амбулаторное лечение или
- В дневном стационаре

Осложнения или безуспешное амбулаторное лечение:

- Лечение в стационаре
- Междисциплинарный подход